

FOLFIRI(フルオロウラシル+イリノテカン)+サイラムザ

適応疾患：大腸癌(2nd line以降)

1コースの期間：2週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	サイラムザ投与30分前までに
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	30分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	30分～60分
	生食	250mL		
6	生食	50mL	点滴静注	15分(サイラムザ終了後に投与)
7	イリノテカン	60～150mg/m ²	点滴静注	90分 レボホリナートと同時に投与
	5%ブドウ糖液	250mL		
8	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分 イリノテカンと同時に投与
	5%ブドウ糖液	250mL		
9	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	15分
	生食	50mL		
10	フルオロウラシル	2400mg/m ²	ポンプにて 持続静注	46時間
	ノボ・ヘパリン注	1mL		
	生食	必要量		
11	ヘパリンNaロック	100単位/mL 10mL	点滴静注	化学療法終了後

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓													
3	↓													
4	↓													
5	↓													
6	↓													
7	↓													
8	↓													
9	↓													
10	←→													
11			↓											

投与順序 1→2→3→4→5→6→7、8→9→10