FOLFIRI（フルオロウラシル+イリノテカン）+ザルトラップ

適 応 疾 患 ： 進行・再発大腸癌

1コースの期間 ： 2週間　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	ザルトラップ	4mg/kg	点滴静注	60分
	生食	100mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	90分
	5%ブドウ糖液	250mL		レボホリナートと同時に投与
6	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	120分
	5%ブドウ糖液	250mL		イリノテカンと同時に投与
7	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	15分
	生食	50mL		
8	フルオロウラシル	2400mg/㎡	ポンプにて持続静注	46時間
	ノボ・ヘパリン注	1mL		
	生食	必要量		
9	ヘパリンNaロック	100単位/mL　10mL	点滴静注	化学療法終了後

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓													
3	↓													
4	↓													
5	↓													
6	↓													
7	↓													
8	←→													
9			↓											

投与順序　1→2→3→4→5、6→7→8→9