

## イリノテカン+アービタックス

適応疾患：再発・切除不能大腸がん 2nd line 以降

1コースの期間：2週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	ポラミン注	5mg	点滴静注	15分
	デキサート注	6.6mg		
	パロノセトロン静注	0.75mg		
	生食	50mL		
4	ポラミン注	5mg	点滴静注	15分
	デキサート注	6.6mg		
	生食	50mL		
5	アービタックス	初回400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	初回120分 2回目以降60分
		2回目以降250mg/m <sup>2</sup>		
	生食	250mL		
6	イリノテカン	100~150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分
	5%ブドウ糖液	250mL		

Rp.	day													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓							↓						
3	↓													
4								↓						
5	↓							↓						
6	↓													

投与順序 day1: 1→2→3→5→6 day8: 2→4→5