イリノテカン+アービタックス

適 応 疾 患 : 再発・切除不能大腸がん 2nd line 以降

<u>1コースの期間</u> : 2週間 <u>上限コース回数</u> : なし

	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間				
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前				
		day2、3:80mg		午前中				
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート				
3	ポララミン注	5mg	点滴静注	15分				
	デキサート注	6.6mg						
	パロノセトロン静注 0.75mg							
	生食	50mL						
4	ポララミン注	5mg	点滴静注	15分				
	デキサート注	キサート注 6.6mg						
	生食	50mL						
5	アービタックス	初回400mg/m ²	点滴静注	初回120分 2回目以降60分				
		2回目以降250mg/m ²						
	生食	250mL						
6	イリノテカン	100∼150mg/m ²	点滴静注	90分				
	5%ブドウ糖液	250mL						

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	\rightarrow	\downarrow	\downarrow											
2	↓							↓						
3	1													
4								1						
5	1							1						
6	↓													

<u>投与順序</u> day1:1→2→3→5→6 day8:2→4→5