

イリノテカン+ベクティビックス

適応疾患：切除不能進行再発大腸がん

1コースの期間：2週間 上限コース回数：なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|-------------|----------------------|------|----------------------|
| 1 | アブレピタントカプセル | day1:125mg | 内服 | 抗がん剤投与60~90分前 午前中 |
| | | day2、3:80mg | | |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | パロノセトン静注 | 0.75mg | 点滴静注 | 15分 |
| | ポララミン注 | 5mg | | |
| | デキサート注 | 4.95mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 4 | ベクティビックス | 6mg/kg | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 5 | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 | 90分 |
| | 5%ブドウ糖液 | 250mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

投与順序 1→2→3→4→5