ベバシズマブ(5mg/kg)

★sLV5FU2、FOLFIRI、mFOLFOX6、IRIS、FOLFOXIRIと併用可★

適 応 疾 患 : 切除不能、再発大腸がん

<u>1 コースの期間</u> : 2 週間 <u>上限コース回数</u> : なし(進行再発がん)

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|--------|--------|------|---------|
| 1 | ベバシズマブ | 5mg/kg | | 30~90分 |
| | 生食 | 100mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | \downarrow | | | | · | | | | | | | | | | |

ベバシズマブ(7.5mg/kg)

★CapeOX、SOX、CapIri、TS-1、カペシタビンと併用可★

適 応 疾 患 : 切除不能、再発大腸がん

<u>1コースの期間</u>: 3週間 <u>上限コース回数</u>: なし(進行再発がん)

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|--------|----------|------|---------|
| 1 | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | 30~90分 |
| | 生食 | 100mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序 1(ベバシズマブ) → 併用可能な他の抗悪性腫瘍剤