

アブラキサン+ゲムシタビン

適応疾患：治癒切除不能な膵癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|----------|-----------------------|------|---------|
| 1 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 2 | グラニセロン静注 | 3mg | 点滴静注 | 15分 |
| | デキサート注 | 6.6mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 3 | アブラキサン | 125mg/m ² | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 4 | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |

| | | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Rp. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序 1→2→3→4