

# ザノサー

適応疾患： 隣神経内分泌腫瘍、消化管神経内分泌腫瘍

1コースの期間： 6週間 上限コース回数： 4回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	ザノサー	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
	生食	100mL		
5	デカドロン錠	2~4日目4mg	内服	朝食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓				
2	↓							↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓							↓						
5		↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓			

	day													
Rp.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓				
2	↓							↓						
3	↓							↓						
4	↓							↓						
5		↓	↓	↓					↓	↓	↓			

投与順序 1→2→3→4