## CG(シスプラチン+ゲムシタビン)

適 応 疾 患 : 胆道系悪性腫瘍(切除不能)

<u>1 コースの期間</u> : 3 週間 <u>上限コース回数</u> : なし

	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間					
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前					
		day2、3:80mg		午前中					
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート					
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分					
	デキサート注	4.95mg	]						
	生食	50mL							
4	シスプラチン	25mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	60分					
	生食	500mL							
5	ゲムシタビン	1000mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	30分					
	生食	100mL							
6	ソルデム3A	500mL	点滴静注	60分					

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$					$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$											
2	<b></b>							$\downarrow$													
3	<b></b>							$\downarrow$													
4	<b></b>							$\downarrow$													
5	<b></b>							$\downarrow$													
6	$\downarrow$							$\downarrow$													

投与順序 1→2→3→4→5→6