イミフィンジ+GC(ゲムシタビン+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 治癒切除不能な胆道癌

<u>1コースの期間</u> : 3週間 <u>上限コース回数</u> : 8コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間					
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前					
		day2、3:80mg		午前中					
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート					
3	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	60分					
	生食	250mL							
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分					
	デキサート注	4.95mg							
	生食	50mL							
5	シスプラチン	25mg/ m ²	点滴静注	60分					
	生食	500mL							
6	ゲムシタビン	1000mg/ m ²	点滴静注	30分					
	生食	100mL							
7	ソルデム3A	500mL	点滴静注	60分					

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		\downarrow	\downarrow					1	\downarrow	\downarrow											
2								1													
3	\downarrow																				
4								1													
5								1													
6	\downarrow							\downarrow													
7	\downarrow						·	\downarrow												·	

投与順序 1日目:1→2→3→4→5→6→7 8日目:1→2→4→5→6→7