

## ゲムシタビン+S-1

適 応 疾 患 ： 胆がん(切除不能)

1 コースの期間 ： 3 週間    上限コース回数 ： なし

| Rp. | 薬剤     | 投与量                    | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|--------|------------------------|------|---------|
| 1   | 生食     | 250mL                  | 点滴静注 | メインルート  |
| 2   | デキサート注 | 6.6mg                  | 点滴静注 | 15分     |
|     | 生食     | 50mL                   |      |         |
| 3   | ゲムシタビン | 1000mg/ m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分     |
|     | 生食     | 100mL                  |      |         |
| 4   | S-1    | 60mg/ m <sup>2</sup>   | 内服   | 朝夕食後    |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1   |     |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 2   |     |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 3   |     |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 4   | ↓   | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |

投与順序    1→2→3