## イリノテカン

適 応 疾 患 ： 乳がん（進行・再発）

1コースの期間 ： 5週間　上限コース回数 ： なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 2 | グラニセトロン注 | 3mg | 点滴静注 | 15分 |
| | デキサート注 | 9.9mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 3 | イリノテカン | 40～100mg/㎡ | 点滴静注 | 90分 |
| | 生食 | 50mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

| | day | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

投与順序　1→2→3