キイトルーダ＋ゲムシタビン＋カルボプラチン

適 応 疾 患 ：

PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性（triple-negative）の治癒切除不能又は転移・再発乳癌

1 コースの期間 ： 3 週間　　上限コース回数 ：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
4	グラニセトロン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分
	生食	100mL		
6	カルボプラチン	AUC2	点滴静注	60分
	生食	250mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓											
2	↓							↓													
3	↓																				
4	↓							↓													
5	↓							↓													
6	↓							↓													

投与順序　day1： 1→2→3→4→5→6　day8： 1→2→4→5→6