

キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチニ

適応疾患：ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスク乳癌（術前補助療法）

1コースの期間：3週間 上限コース回数：4コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2, 3: 80mg		午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーウ錠	50mg	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	点滴静注	30分
5	デキサート注 ファモチジン注	8.25mg 20mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注
6	グラニセトロン注 生食	3mg 50mL	点滴静注	30分
7	生食	50mL	点滴静注	30分
8	パクリタキセル 生食	80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分
9	カルボプラチニ 生食	AUC5 250mL	点滴静注	30分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓							↓													
3	↓							↓													
4	↓																				
5	↓							↓													
6	↓																				
7								↓													
8	↓							↓													
9	↓																				

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→6→8→9 day8, 15: 2→3→5→7→8