

オブジーボ+ヤーポイ+パクリタキセル+カルボプラチン

適応疾患：切除不能な進行非小細胞肺癌

1コースの期間：6週間 上限コース回数：1コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	オブジーボ	360mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
4	生食	50mL	点滴静注	30分
5	ヤーポイ	1mg/kg	点滴静注	30分
	生食	30mL		
6	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
7	デキサート注	19.8mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に 緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
8	グラニセトロン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
9	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	180分
	生食	500mL		
10	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	30分
	生食	250mL		

	day																												
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	↓	↓	↓																				↓	↓	↓				
2	↓																						↓						
3	↓																						↓						
4	↓																												
5	↓																												
6	↓																						↓						
7	↓																						↓						
8	↓																						↓						
9	↓																						↓						
10	↓																						↓						

	day													
Rp.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10

day22: 1→2→3→6→7→8→9→10