

## サイラムザ + ドセタキセル

適応疾患：切除不能な進行非小細胞肺癌・切除不能な再発非小細胞肺癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	レスタミンコーワ錠	5錠 (50mg)	内服	サイラムザ投与30分前までに
3	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	生食	100mL	点滴静注	30分
5	サイラムザ	10mg/kg	点滴静注	30分～60分
	生食	250mL		
6	生食	100mL	点滴静注	60分 (サイラムザ投与後のブランク、3コース目からは短縮可能)
7	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	生食	250mL		
8	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓	↓																			

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7