

シスプラチン + S-1

適応疾患：肺扁平上皮がん

1コースの期間：3~4週間 上限コース回数：4~6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
5	シスプラチン注	60~75mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	500mL		
6	フロセミド注	20mg	静注	緩徐に静注
7	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後
8	S-1		内服	朝夕食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7		↓	↓	↓																	
8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

* S-1 の投与量

体表面積

< 1.25 m² 40mg/回 1日2回

1.25~1.50 m² 50mg/回 1日2回

1.50 m² ≤ 60mg/回 1日2回