

シスプラチン + ゲムシタビン

適応疾患：非小細胞肺癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	100mL		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	500mL		
9	フロセミド注	20mg	静注	緩徐に静注
10	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3								↓													
4	↓																				
5								↓													
6	↓							↓													
7	↓																				
8	↓																				
9	↓																				
10		↓	↓	↓																	

投与順序 day1: 1 → 2 → 4 → 6 → 7 → 8 → 9 day1: 3 → 5 → 6