

パクリタキセル + カルボプラチン + ベバシズマブ

適応疾患：扁平上皮がんを除く非小細胞肺癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注	19.8mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に 緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
5	グラニセロン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
6	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	90分
	生食	250mL		
7	カルボプラチン	AUC5~6	点滴静注	90分
	生食	250mL		
8	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分~90分
	生食	100mL		

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8