

パクリタキセル + カルボプラチン + ベバシズマブ + テセントリク

適応疾患：切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、非扁平上皮肺癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	テセントリク	1200mg	点滴静注	30分～60分
	生食	250mL		
4	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分～90分
	生食	100mL		
5	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
6	デキサート注	19.8mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に 緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
7	グラニセトン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
8	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分
	5%ブドウ糖液	500mL		
9	カルボプラチン	AUC5～6	点滴静注	60分
	5%ブドウ糖液	250mL		

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	↓	↓	↓																			
2	↓																					
3	↓																					
4	↓																					
5	↓																					
6	↓																					
7	↓																					
8	↓																					
9	↓																					

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9