

ペムトレキセド + シスプラチン + ベバシズマブ

適応疾患：進行非小細胞・非扁平上皮がん

1コースの期間：3週間 上限コース回数：4～6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3:80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	ペムトレキセド	500mg/m ²	点滴静注	10分
	生食	100mL		
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
6	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
7	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分～90分
	生食	100mL		
8	フロセミド注	20mg	静注	緩徐に静注
9	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				
9		↓	↓	↓																	

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8