

ADOC(ドキシソルビシン+シスプラチン+オンコビン+エンドキサン)

適応疾患 : 胸腺上皮性腫瘍

1コースの期間 : 3週間 上限コース回数 : 10コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1 : 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3 : 80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	ドキシソルビシン	40mg/m ²	静注	3分
	生食	20mL		
6	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
7	シスプラチン	50mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
8	フロセמיד注	20mg	静注	緩徐に静注
9	オンコビン	0.6mg/m ²	静注	1分
	生食	20mL		
10	グラニセトロン	3mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
11	エンドキサン	700mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
12	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3			↓	↓																	
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				
9			↓																		
10				↓																	
11				↓																	
12		↓	↓	↓	↓	↓															

投与順序 day1 : 1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 day3 : 3 → 9 day4 : 3 → 10 → 11