

サイラムザ+エルロチニブ

適応疾患：切除不能な進行・再発の EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌

1コースの期間：2週間 上限コース回数：なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|-----------|----------|------|----------------|
| 1 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 2 | レスタミンコーワ錠 | 5錠(50mg) | 内服 | サイラムザ投与30分前までに |
| 3 | サイラムザ | 10mg/kg | 点滴静注 | 30分～60分 |
| | 生食 | 250mL | | |
| 4 | エルロチニブ錠 | 150mg/日 | 内服 | 1日1回(特記事項参照) |

| | day | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

投与順序 1 → 2 → 3