

シスプラチン + S-1 + 放射線療法（ショートハイドレーション法）

適 応 疾 患：非小細胞肺癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：2コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	KCL注	10mEq	点滴静注	60分
	硫酸Mg補正液	8mL		
	ソルデム1輸液	500mL		
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
6	シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	500mL		
7	KCL注	10mEq	点滴静注	60分
	ソルデム1輸液	500mL		
8	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後
9	S-1	80mg/m ² /day	内服	朝夕食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓																											
3	↓																											
4	↓																											
5	↓																											
6	↓																											
7	↓																											
8		↓	↓	↓																								
9	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7