

ペメトレキセド + シスプラチン + ベバシズマブ

適 応 疾 患 ： 進行非小細胞・非扁平上皮がん

1 コースの期間 ： 3 週間 上限コース回数 ： 4～6 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトン静注 デキサート注 生食	0.75mg 9.9mg 50mL	点滴静注	15分
4	ペメトレキセド 生食	500mg/ m ² 100mL	点滴静注	10分
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
6	シスプラチン 生食	75mg/ m ² 500mL	点滴静注	120分
7	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30分～90分
8	フロセミド注	20mg	静注	緩徐に静注
9	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				
9		↓	↓	↓																	

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8