

DdTC(パクリタキセル+カルボプラチン)

適応疾患： 卵巣癌

1コースの期間： 3週間 上限コース回数： なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|-------------|-----------------------------|------|----------------------|
| 1 | アブレピタントカプセル | day1: 125mg day2、3: 80mg | 内服 | 抗がん剤投与60～90分前 午前中 |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | レスタミンコーワ錠 | 5錠(50mg) | 内服 | パクリタキセル投与30分前までに |
| 4 | デキサート注 | 8.25mg | 静注 | パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注 |
| | ファモチジン注 | 20mg | | |
| 5 | パロノセトロン静注 | 0.75mg | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 50mL | | |
| 6 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 30分 |
| 7 | パクリタキセル | 70～80mg/m ² | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 250mL | | |
| 8 | カルボプラチン | AUC5～6 | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 250mL | | |

| Rp. | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 5 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 7 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 8 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→7→8 day8、15: 2→3→4→6→7