

DdTC(パクリタキセル+カルボプラチン)+アバスチン

適応疾患：進行、再発卵巣癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：5回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3:80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注	8.25mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
6	生食	50mL	点滴静注	30分
	パクリタキセル	70~80mg/m ²		
7	生食	250mL	点滴静注	60分
	カルボプラチン	AUC5~6		
8	生食	250mL	点滴静注	60分
	アバスチン	15mg/kg		
9	生食	100mL	点滴静注	30-90分

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓						↓								↓						
3	↓						↓								↓						
4	↓						↓								↓						
5	↓																				
6							↓								↓						
7	↓						↓								↓						
8	↓																				
9	↓																				

投与順序

day1:1→2→3→4→5→7→8→9 day8、15:2→3→4→6→7