

# ゲムシタビン

適応疾患：再発卵巣癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

| Rp. | 薬剤     | 投与量                   | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|--------|-----------------------|------|---------|
| 1   | 生食     | 250mL                 | 点滴静注 | メインルート  |
| 2   | デキサート注 | 6.6mg                 | 点滴静注 | 15分     |
|     | 生食     | 50mL                  |      |         |
| 3   | ゲムシタビン | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分     |
|     | 生食     | 100mL                 |      |         |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

投与順序 1→2→3