

Triweekly TC(パクリタキセル+カルボプラチン)+アバステン

適応疾患：子宮頸癌再発・進行子宮頸癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：6回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注	19.8mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
6	パクリタキセル	175~180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分
	生食	250mL		
7	カルボプラチン	AUC5~6	点滴静注	60分
	生食	250mL		
8	アバステン	15mg/kg	点滴静注	30-90分
	生食	100mL		

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				

投与順序 1→2→3→4→5→6→7→8