## カルボプラチン

適 応 疾 患 ： 子宮体がん再発

1コースの期間 ： 3週間　　上限コース回数 ： なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アプレピタントカプセル | day1：125mg | 内服 | 抗がん剤投与60～90分前 |
| | | day2、3：80mg | | 午前中 |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | グラニセトロン注 | 3mg | 点滴静注 | 15分 |
| | デキサート注 | 4.95mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 4 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 250mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序　1→2→3→4