CDDP+ADM(シスプラチン+ドキソルビシン)(放射線療法併用動注化学療法)

適 応 疾 患 : 膀胱がん

<u>1 コースの期間</u> : 4週間 <u>上限コース回数</u> : 4コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間						
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前						
		day2、3:80mg		午前中						
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート						
3	ソルアセトF	500mL	点滴静注	180分						
	ファモチジン注	20mg								
	ヒシファーゲン配合静注	20mL								
4	マンニットール注	300mL	点滴静注	60分						
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分						
	デキサート注	9.9mg								
	生食	50mL								
6	シスプラチン	70mg/ m ²	動注	30分						
7	ドキソルビシン	30mg/ m ²	動注	10-20分						
	生食	50mL]							

	day	ay																										
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	\rightarrow	\downarrow	\downarrow																									
2	\downarrow																											
3	\rightarrow																											
4	\rightarrow																											
5	\rightarrow																											
6	\downarrow																											
7	→																											

投与順序 1→2→3→4→5→6→7