

GC 療法(ゲムシタビン+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 進行性尿路移行上皮癌

1コースの期間 : 4週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	生食	500mL	点滴静注	メインルート
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
6	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	100mL		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
8	シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
9	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓							↓							↓													
3		↓																										
4	↓							↓							↓													
5		↓																										
6	↓							↓							↓													
7		↓																										
8		↓																										
9			↓	↓	↓																							

投与順序 Day1,8,15: 2→4→6 Day2: 1→3→5→7→8