GCarbo 療法（ゲムシタビン ＋ カルボプラチン）

適 応 疾 患 ： 進行性尿路移行上皮癌

1 コースの期間 ： 4 週間　　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	30分
	生食	100mL		
6	カルボプラチン	AUC4.5	点滴静注	90分
	生食	500mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓	↓						↓							↓													
3	↓							↓							↓													
4		↓																										
5	↓							↓							↓													
6		↓																										

投与順序　Day1,8,15： 2→3→5　Day2：1→2→4→6