M-VACarbo 療法（メソトレキセート＋エクザール＋ドキソルビシン＋カルボプラチン）

適 応 疾 患 ： 移行上皮癌

1 コースの期間 ： 4 週間　　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
4	メソトレキセート	30mg/㎡	点滴静注	60分
	生食	100mL		
5	エクザール	3mg/㎡	点滴静注	30分
	生食	50mL		アドリアシンと同時投与
6	ドキソルビシン	30mg/㎡	点滴静注	30分
	生食	100mL		エクザールと同時投与
7	カルボプラチン	AUC4.5	点滴静注	90分
	生食	500mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓	↓													↓							↓						
3		↓																										
4	↓														↓							↓						
5		↓													↓							↓						
6		↓																										
7		↓																										

投与順序　Day1：2→4　Day2：1→2→3→5、6→7　Day15、22：2→4→5