

M-VACarbo 療法(メソトレキセート+エクザール+ドキソルビシン+カルボプラチン)

適応疾患：移行上皮癌

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3:80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
4	メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	100mL		
5	エクザール	3mg/m ²	点滴静注	30分 アドリアシンと同時投与
	生食	50mL		
6	ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分 エクザールと同時投与
	生食	100mL		
7	カルボプラチン	AUC4.5	点滴静注	90分
	生食	500mL		

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓	↓													↓								↓					
3		↓																										
4	↓														↓													
5		↓													↓													
6		↓																										
7		↓																										

投与順序 Day1:2→4 Day2:1→2→3→5、6→7 Day15、22:2→4→5