## ドセタキセル＋プレドニン

適 応 疾 患 ： 前立腺癌

1コースの期間 ： 3週間　上限コース回数 ： なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレドニン錠 | 10mg/日 | 内服 | 朝夕食後 |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | デキサート注 | 6.6mg | 点滴静注 | 15分 |
| | 生食 | 50mL | | |
| 4 | ドセタキセル | 70mg/㎡ | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 250mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 2 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序　2→3→4