

## BEP 療法(ブレオ+ラステット+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 進行性精巣腫瘍

1コースの期間 : 3週間 上限コース回数 : 4コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3:80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセロン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
6	シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分
	生食	500mL		
7	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	生食	500mL		
8	ブレオ	30mg/body	点滴静注	60分
	生食	100mL		

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓	↓																
3								↓							↓						
4	↓	↓	↓	↓	↓																
5	↓	↓	↓	↓	↓																
6	↓	↓	↓	↓	↓																
7	↓	↓	↓	↓	↓																
8		↓						↓							↓						

投与順序 Day1、3、4、5:1→2→4→5→6→7 Day2:2→4→5→6→7→8 Day8、15:3→8