

Pola-R-CHP 療法 (ポライビー+リツキシマブ+エンドキサン+ドキシソルビシン+プレドニン)

適応疾患 : 未治療びまん性大細胞型 B リンパ腫

1コースの期間 : 3週間 上限コース回数 : 8コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール	400mg	内服	分子標的薬投与30分前までに内服
	ペポタスチン	10mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	プレドニン	100mg	点滴静注または内服	
4	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量 (1~4mg/mLに希釈)		
6	ポライビー	1.8mg/kg	点滴静注	30-90分
	注射用水	20mL		
	生食	100mL		
7	ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注	15分
	生食	50mL		
8	エンドキサン	750mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	100mL		

1-6コース 1日 ver

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																					
2	↓																					
3	↓	↓	↓	↓	↓																	
4	↓																					
5	↓																					
6	↓																					
7	↓																					
8	↓																					

1-6コース 2日 ver

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓																				
2	↓	↓																				
3	↓	↓	↓	↓	↓																	
4	↓																					
5	↓																					
6		↓																				
7	↓																					
8	↓																					

7-8コース

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																					
2	↓																					
3																						
4																						
5	↓																					
6																						
7																						
8																						

投与順序 1-6コース 1日 ver の day1 : 1→2→3→4→5→6→7→8

1-6コース 2日 ver の day1 : 1→2→3、4→5→7→8 day2 : 1→2→3→6

7-8コース目の day1 : 1→2、5