

# R-CHOP（リツキシマブ＋エンドキサン＋ドキシソルピシン＋オンコビン＋プレドニン）

適応疾患：CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫

1コースの期間：2週間

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	解熱鎮痛剤		内服	リツキシマブ投与30分前に内服
	抗ヒスタミン剤			
3	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	特記事項参照
	5%ブドウ糖液	必要量		
4	パロノセトロン注	0.75mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	プレドニン	50mg	静注 (内服でも可)	3分
	生食	20mL		
6	オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分
	生食	50mL		
7	ドキシソルピシン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分
	生食	50mL		
8	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分
	生食	100mL		

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓												
2	↓													
3	↓													
4		↓												
5		↓	↓	↓	↓	↓								
6		↓												
7		↓												
8		↓												

投与順序：day1：1→2→3 day2：1→4→5→6→7、8