

PolaRB 療法(ポライビー+リツキシマブ+ベンダムスチン)

適 応 疾 患 ： 再発・難治性びまん性大細胞型 B リンパ腫

1 コースの期間 ： 3 週間 上限コース回数 ： 6 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤 抗ヒスタミン剤		内服	リツキシマブ、ポライビー投与30分前
2	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
3	生食	250mL/500mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセトロン注 デキサート注 生食	3mg 4.95mg 50mL	点滴静注	15～30分
5	リツキシマブ注 生食	375mg/m ² 必要量	点滴静注	特記事項参照
6	ポライビー注 生食 注射用水	1.8mg/kg 100mL 必要量	点滴静注	初回90分 2回目以降30分
7	生食	50mL	点滴静注	30分(ポライビー終了後に投与)
8	ベンダムスチン注 生食	90mg/m ² 50mL	点滴静注	10分

1 コース目

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓																			
2		↓	↓	↓																	
3	↓	↓	↓																		
4		↓	↓																		
5	↓																				
6		↓																			
7		↓																			
8		↓	↓																		

投与順序 1 日目: 1→3→5 2 日目: 1→2→3→4→6→7→8 3 日目: 2→3→4→8

2 コース目以降

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓	↓	↓																		
3	↓	↓																			
4	↓	↓																			
5	↓																				
6	↓																				
7																					
8	↓	↓																			

投与順序 1 日目: 1→2→3→4→5→6→8 2 日目: 2→3→4→8