R-B+イムブルビカ

適応疾患：未治療のマントル細胞リンパ腫

1コースの期間：4週間 上限コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール	400mg	内服	リツキシマブ投与30分前までに内服
	ベポタスチン	10mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	15分
4	デキサート	9.9mg		
	生食	50mL		
5	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量(1~4mg/mLに希釈)		
6	ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴静注	10分
	生食	50mL		
7	イムブルビカ	560mg	内服	1日1回内服

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓																											
2	↓	↓																										
3	↓																											
4	↓	↓																										
5	↓																											
6	↓	↓																										
7	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与順序 day1：1→2→3、4→5→6 day2：2→4→6