## DLd療法(ダラキューロ+レナリドミド+デキサメタゾン)

適 応 疾 患 :多発性骨髄腫

<u>1 コースの期間</u> : 4週間 <u>上限コース回数</u> : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール錠	400mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
	ベポタスチンベシル酸OD錠	10mg		
	キプレスOD錠	10mg		
2	レナデックス錠	20mg~40mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
3	ダラキューロ	15mL	皮下注射	3-5分
4	レナリドミドカプセル	10∼25mg	内服	

1~2コース目

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1																											
2	<b>1</b>	<b>\</b>						$\downarrow$	$\downarrow$						$\downarrow$	$\downarrow$						$\downarrow$	$\downarrow$					
3	1							1							1							<b></b>						
4	$\downarrow$																											

3~6コース目

· · · · · · ·																												
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	$\downarrow$														$\downarrow$													
2	1	<b>1</b>						<b>\</b>							$\downarrow$	<b></b>						$\downarrow$						
3	$\downarrow$														$\downarrow$													
4	$\downarrow$																											

7コース目以降

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	$\downarrow$																											
2	1	$\downarrow$						1							1							$\downarrow$						
3	$\downarrow$																											
4	$\downarrow$	Ī																										

投与順序 1 → 2 → 3