

## Isa単剤療法

適応疾患：再発・難治性の多発性骨髄腫

1コースの期間：4週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール錠	500mg	内服	サークリサ投与15～60分前に
	ベボタスチンベシル酸塩OD錠	10mg		
	ファモチジンD錠	20mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	ソル・メドロール静注用	100mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	生食	50mL	点滴静注	15分
5	サークリサ	20mg/kg	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量(総量250mLとする)		

### 1コース目

		day																												
Rp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	↓								↓							↓														
2	↓								↓							↓														
3	↓								↓							↓														
4	↓								↓							↓														
5	↓								↓							↓														

### 2コース目以降

		day																												
Rp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	↓															↓														
2	↓															↓														
3	↓															↓														
4	↓															↓														
5	↓															↓														

投与順序：1→2→3→4→5