

VRD-lite(ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン)

適応疾患：多発性骨髓腫

1コースの期間 1-9コース:5週間、10-15コース:4週間

上限コース回数: 15コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	デキサメタゾン※	20mg	内服または点滴	15分
2	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注射	
3	生食	必要量		
3	レナリドミドカプセル	15mg	内服	

1-9コース

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓								↓	↓			
2	↓							↓							↓										↓			
3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		

	day						
Rp.	29	30	31	32	33	34	35
1							
2							
3							

10-15コース

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																												
2	↓														↓													
3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		

投与順序: 1-9コース day1,8,15: 1→2→3 10-15コース day1,15: 2→3