

ベスポンサ

適応疾患：再発・難治性 CD22 陽性の急性リンパ性白血病

1コースの期間 1コース目:3週間 2コース目以降:4週間

上限コース回数：6コース

★2コース目以降

寛解、非寛解で day1 の
投与量が異なります。

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤		内服	ベスポンサ投与30分前
	抗ヒスタミン剤			
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	グラニセトロン	3mg	点滴静注	30分
	デキサート	9.9mg		
	生食	50mL		
4	ベスポンサ	day1:0.8mg/m ² (寛解時2~6コース:0.5mg/m ²) day8、15:0.5mg/m ²	点滴静注	60分
	注射用水	必要量		
	生食	必要量(総量50mLとする)		

1コース

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓							↓							↓						
2	↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓						

2~6コース

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓													
2	↓							↓							↓													
3	↓							↓							↓													
4	↓							↓							↓													

投与順序 1→2→3→4