

DAV フェロン(ダカルバジン+ニドラン+オンコビン+フェロン)

適 応 疾 患 : 悪性黒色腫

1コースの期間 : 30~39 日間 × 2~3 コース 上限コース回数: なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	ダカルバジン	80~140mg/m ²	静注	3分
	注射用水	20mL		
5	ニドラン	50~80mg/m ²	静注	3分
	注射用水	20mL		
6	オンコビン	0.5~0.8mg/m ²	静注	3分
	生食	20mL		
7	フェロン	300万単位	皮内注	
	ロカイン(1%)	1mL		

Rp.	day																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	↓	↓	↓																											
2	↓	↓	↓	↓	↓																									
3	↓	↓	↓	↓	↓																									
4	↓	↓	↓	↓	↓																									
5	↓																													
6	↓																													
7	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)	(↓)	(↓)	(↓)	(↓)																				

投与順序 Day1: 1→2→3→4→5→6→7 Day2-5: 2→3→4→7