アービタックス＋シスプラチン＋フルオロウラシル

適 応 疾 患 ： 頭頸部癌再発、転移、進行癌

1コースの期間 ： 3週間　上限コース回数 ： 6回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	500mL（day8,15は250mL）	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	ポララミン注	5mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	ポララミン注	5mg		
	生食	50mL		
6	アービタックス注	初回400mg/㎡	点滴静注	初回120分
		2回目以降250mg/㎡		2回目以降60分
	生食	250mL		
7	マンニットール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	120分
	生食	500mL		
9	フルオロウラシル	1000mg/㎡	点滴静注	24時間
	生食	500mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓				↓							↓						
3	↓																				
4		↓	↓	↓																	
5								↓							↓						
6	↓							↓							↓						
7	↓																				
8	↓																				
9	↓	↓	↓	↓																	

投与順序　day1：1→2→3→6→7→8→9　day2～4：2→4→9　day8、15：2→5→6