## キイトルーダ＋FP（フルオロウラシル+シスプラチン）

適 応 疾 患 ： 再発又は転移性の頭頸部癌

1コースの期間 ： 3週間　　上限コース回数 ： 6コース

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アプレピタントカプセル | day1：125mg | 内服 | 抗がん剤投与60～90分前 |
| | | day2、3：80mg | | 午前中 |
| 2 | 生食 | 500mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | パロノセトロン静注 | 0.75mg | 点滴静注 | 15分 |
| | デキサート注 | 9.9mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 4 | デキサート注 | 6.6mg | 点滴静注 | 15分 |
| | 生食 | 50mL | | |
| 5 | キイトルーダ | 200mg/body | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 6 | マンニットール注 | 300mL | 点滴静注 | 30分 |
| 7 | シスプラチン | 80～100mg/㎡ | 点滴静注 | 120分 |
| | 生食 | 300mL | | |
| 8 | フルオロウラシル | 800～1000mg/㎡ | 点滴静注 | 24時間 |
| | 生食 | 500mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与順序　day1：1→2→3→5→6→7→8　　day2-4：2→4→8