

キイトルーダ+FP(フルオロウラシル+シスプラチン)

適応疾患：再発又は転移性の頭頸部癌

1コースの期間：3週間 上限コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
6	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
7	シスプラチン	80~100mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	300mL		
8	フルオロウラシル	800~1000mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	500mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓																	
3	↓																				
4		↓	↓	↓																	
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓	↓	↓	↓																	

投与順序 day1:1→2→3→5→6→7→8 day2-4:2→4→8