ドセタキセル　＋　カルボプラチン　＋フルオロウラシル

適　応　疾　患　：　頭頸部がん・扁平上皮がん

1コースの期間　：　4週間　　上限コース回数　：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	デキサート注	3.3mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	ドセタキセル	50～70mg/㎡	点滴静注	60分
	生食	250mL		
6	カルボプラチン	AUC4～5	点滴静注	120～240分
	生食	500mL		
7	フルオロウラシル	500～750mg/㎡	点滴静注	20～24時間
	生食	1000mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1				↓	↓	↓																						
2	↓	↓	↓	↓	↓																							
3	↓	↓	↓		↓	↓																						
4				↓																								
5	↓																											
6				↓																								
7	↓	↓	↓	↓	↓																							

投与順序　day1：2→3→5→7　day2、3、5：2→3→7　day4：1→2→4→6→7